

Dr n.med.Konrad Wąsikowski

Ocena skuteczności działania preparatów BioMarine 570, BioMarine 1140 oraz BioCardine 900 u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.

W okresie od 01 04 2007 r do 30 09 2007 r włączono 38 pacjentów leczonych preparatami BioMarine 570, BioMarine 1140 oraz BioCardine 900 w dawkach 1,5 g przez okres 6 miesięcy.

W skład grupy wchodziło 22 mężczyzn w wieku 39 – 62 lat oraz 16 kobiet w wieku 41 – 57 lat.

18 mężczyzn leczonych było tylko preparatem BioCardine 900, 4 BioCardine 900, BioMarine 570 lub BioMarine 1140. Wszystkie kobiety otrzymywały leczenie skojarzone. Wszyscy pacjenci byli standardowo leczeni lekami wieńcowymi oraz statynami lub fibratami. Średni poziom cholesterolu w grupie mężczyzn wynosił 234 mg%, średni poziom trójglicerydów 178 mg%.

Średni poziom cholesterolu w grupie kobiet wynosił 222 mg%, średni poziom trójglicerydów 156 mg %.

W trakcie terapii nie modyfikowano dawek leków wieńcowych, jak i dawek preparatów Bio-. W grupie mężczyzn w trzecim miesiącu leczenia uzyskano redukcję cholesterolu o 5%, w szóstym o 8,4% oraz redukcję trójglicerydów po trzech miesiącach o 9,2 %, po sześciu miesiącach o 10,1%.

W grupie kobiet odpowiednio redukcję cholesterolu o 4,4% po trzech miesiącach i 6,8% po sześciu miesiącach oraz trójglicerydów o 8,8% po trzech miesiącach i 9,4% po sześciu miesiącach.

Stwierdziłem, że lepsze efekty terapeutyczne uzyskano w trakcie leczenie kompleksowego w porównaniu z leczeniem pojedynczym preparatem.

Z satysfakcją stwierdziłem, że chorzy nie wymagali zwiększenia dawek dotychczas stosowanych statyn i fibratów.

Nie stwierdziłem objawów ubocznych stosowanych nowych preparatów.

Jednym z 22 mężczyzn zakwalifikowanym do badania byłem osobiście. Stwierdziłem, że oprócz leczenia hipolipemicznego preparaty te mają bardzo korzystny efekt na kondycję fizyczną oraz poprawę jędrności skóry.

Wnioski:

1. Preparat BioCardine 900 należy polecać pacjentom z hipercholesterolemią i hipertrójglicydemią, a zwłaszcza nietolerującym wyższych dawek statyn lub fibratów.
2. Łączne stosowanie powyższych preparatów może mieć jeszcze lepsze działanie protekcyjne.
3. Leczenie nie spowodowało obecności objawów niepożądanych.
4. Preparatami powinni zainteresować się dermatolodzy, gabinety odnowy i rehabilitacji.

dr n. med. Konrad Wąsikowski
choroby wewnętrzne
1044716